

Verhalten nach operativen Eingriffen im Mund- / Kieferbereich:

Beißen Sie ca. 60 Minuten auf die eingelegten Mulltupfer und entfernen Sie diese anschließend. Leichte Blutungen am Operationstag sind nicht ungewöhnlich und können in der Regel durch Kompression (weitere Mulltupfer einlegen und aufbeißen) selbst gestillt werden.

Zur Reduktion von Weichteilschwellungen sollten sie in den ersten beiden Tagen nach dem Eingriff die Wangen von außen kühlen. Postoperative Wundschmerzen für einige Tage sind normal. Bitte nehmen Sie die verordneten Medikamente wie mit Ihnen besprochen ein.

Nach dem Entfernen der Mulltupfer können sie trinken (nichts Heißes). Warten Sie mit dem Essen bis die Wirkung der örtlichen Betäubung komplett nachgelassen hat und versuchen sie die Wundbereiche beim Essen zu schonen.

Zur Desinfektion und Hygiene der Wundbereiche verwenden Sie bitte die von uns empfohlene Mundspülung (z. B. Chlorhexamed Fluid 0,1%). Die Spülung sollte einen Tag nach der Operation bis zur Entfernung der Fäden (nach einer Woche) verwendet werden (ca. 3x täglich in kleiner Menge und für wenige Sekunden).

Bis zur Entfernung der Fäden sollten Sie keinen Sport treiben und körperliche Anstrengungen vermeiden.

Selbstverständlich können Sie uns bei Fragen gerne kontaktieren.

Wir wünschen Ihnen eine gute Erholung!