

Zachowanie po operacjach w obrębie jamy ustnej / szczęki:

Przeżuwaj około 60 minut na włożonych tamponach gazowych, a następnie usuń je. Delikatne krwawienie w dniu operacji nie jest niezwykle i zazwyczaj można je zatrzymać poprzez ucisk (umieszczenie dodatkowych tamponów gazowych i ich przegryzienie).

Aby zmniejszyć opuchliznę tkanek miękkich, powinieneś chłodzić policzki od zewnątrz w ciągu pierwszych dwóch dni po zabiegu. Ból pooperacyjny przez kilka dni jest normalny. Proszę zażywać przepisane leki zgodnie z ustaleniami.

Po usunięciu tamponów gazowych możesz pić (niczego gorącego). Poczekaj, aż całkowicie ustąpi działanie znieczulenia miejscowego przed jedzeniem i staraj się oszczędzać obszary chirurgiczne podczas jedzenia.

Do dezynfekcji i higieny obszarów operacyjnych prosimy używać polecanej przez nas płyny do płukania ust (np. Chlorhexamed Fluid 0,1%). Płukanie należy stosować od dnia po operacji do usunięcia szwów (po tygodniu) (około 3 razy dziennie, w niewielkiej ilości i przez kilka sekund).

Do czasu usunięcia szwów należy unikać uprawiania sportu i wysiłku fizycznego.

Oczywiście, w przypadku pytań możesz się z nami skontaktować.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!